

گیاهان دارویی استان کردستان

فرهنگ هوشیدری^۱

۱- مریمی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان، پست الکترونیک: hooshidar2005@yahoo.com

تاریخ پذیرش: مهر ۱۳۸۷

تاریخ اصلاح نهایی: شهریور ۱۳۸۷

تاریخ دریافت: تیر ۱۳۸۷

حکیمہ

هدف از اجرای این تحقیق جمع‌آوری گیاهان دارویی استان کردستان، شناسایی و تکمیل اطلاعات علمی در زمینه گیاهان دارویی استان بود. برای این منظور، ضمن مراجعه مکرر به مناطق مختلف استان نسبت به جمع‌آوری گیاهان دارویی موجود و گیاهان مورد مصرف افراد محلی اقدام شد و ضمن تهیه نمونه هر با ریومی از نمونه های جمع‌آوری شده، موارد مصرف آنها ثبت و در زمان مناسب نسبت به جمع‌آوری بذر آنها نیز اقدام شد. نتیجه این تحقیق جمع‌آوری و شناسایی ۱۴۴ گونه گیاه دارویی بود. بیشترین گونه ها به ترتیب تعداد متعلق به خانواده های Compositae با ۱۸ گونه، Umbelliferae با ۱۶ گونه، Papilionaceae با ۱۱ گونه، Cruciferae با ۸ گونه، Labiatea با ۱۰ گونه، Solanaceae با ۶ گونه، Ranunculaceae با ۴ گونه، Rosaceae با ۱ گونه، Malvaceae با ۳ گونه و Liliacea با ۳ گونه بود. بقیه خانواده ها بجز Linacea، Anacardiaceae، Alliaceae با ۳ گونه، Caryophyllaceae، Chenopodiaceae، Papaveraceae، Tamaricaceae، Orchidaceae و Polygonaceae تنها یک گونه دارویی، را شامل می شدند.

واژه‌های کلیدی: گیاهان دارویی، جمع‌آوری، شناسایی، استان کرستان.

٤٠٣

گامهای بلندی در جهت حفظ محیطزیست و درمان بیماریها و تهیه مواد اولیه جهت صنایع مختلف، ایجاد اشتغال و تأمین منبع درستی جهت صادرات برداشت. مصرف گیاهان دارویی از دیرباز در کشور متداول بوده و چه بسا بیماریهای لاعلاج که با استفاده از گیاهان دارویی معالجه شده است. به همین دلیل لازم است اطلاعات علمی، اقتصادی و اجتماعی موجود در میان مردم جمع آوری و گیاهان مورد استفاده از لحاظ علمی شناسایی شوند.

شرایط متنوع اقلیمی و تنوع پوشش گیاهی سبب شده است که کشور ایران از دیرباز به عنوان تولیدکننده و صادرکننده اقلام مهم دارویی از جمله کتیرا و آنفوزه و ... محسوب گردد. با برنامه‌ریزی مناسب در این زمینه می‌توان در درجه اول از بهره‌برداری بی‌رویه گیاهان دارویی به صورت برداشت مستقیم از طبیعت که منجر به تخریب پوشش گیاهی و انقراض گونه‌های بالارزش گیاهیست ممانعت بعمل آورد و در شانزی با ایجاد نظام درستی، برای کاشت، داشت و برداشت گیاهان دارویی،

هستند که بارندگیهای سالانه غرب کشور از جمله کردستان از جریان مدیترانه‌ای نشأت می‌گیرد که بیشتر ریزش‌های جوی در زمستان صورت می‌گیرد.

میانگین بارندگی سالیانه در ایستگاه سینوپتیک سنتندج ۵۰۹/۸ میلی‌متر است و حداقل بارش در بانه ۷۱۳/۲ میلی‌متر در سال حداقل در بیانلو شهرستان بیجار با ۲۲۷/۹ میلی‌متر در سال می‌باشد. میزان بارندگی از شرق به غرب استان افزوده شده و وجود جنگلهای بلوط در غرب استان مؤید این امر است.

استان کردستان با مساحتی حدود ۲۸۰۰ کیلومتر مربع در غرب ایران در مجاورت خاک عراق بین ۳۴ درجه و ۴۴ دقیقه تا ۳۶ درجه و ۳۰ دقیقه عرض شمالی و ۴۵ درجه و ۳۱ دقیقه تا ۴۱ درجه و ۱۶ دقیقه طول شرقی قرار دارد. بلندترین ارتفاعات استان در کوهستانهای شاهو با ارتفاع ۳۲۲۵ متر و پستترین نقطه استان، جاده حجيج به پاوه در اورامان با ۶۲۰ متر ارتفاع از سطح دریا می‌باشد. حداقل مطلق درجه حرارت +۴۲ و حداقل مطلق درجه حرارت -۳۱ درجه سانتی‌گراد می‌باشد.

بررسی تیپهای مرتعی و جنگلی در استان نشان می‌دهد که مراتع استان با مساحت ۱۱۳۰۰۱۴ هکتار برابر با ۳۹/۲۱ درصد از مساحت استان و جنگلهای استان با مساحت ۲۵۳۳۵۲ هکتار حدود ۸/۷۹ درصد مساحت استان را به خود اختصاص داده است. تیپ اراضی استان شامل: ۱- کوهستانها با فراوانی ۴۶/۰۷ درصد شامل کوههای با قلل مدور و دره‌های عمیق دارای شیب تند و نقصان پوشش خاکی و فقیر بودن پوشش گیاهی است؛ ۲- تپه‌ها با فراوانی حدود ۲۵/۸۴ درصد شامل تپه‌های نسبتاً مرتفع سنگی و تپه‌های جنگلی است. دارای شیب تند و خاک کم عمق است و از پوشش گیاهی بهتری بدلیل

در همین راستا جمع‌آوری و شناسایی گیاهان دارویی در استان کردستان از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۵ بررسی منابع موجود در زمینه گیاهان دارویی (زرگری، صداقت، ۱۳۷۱) نشان می‌دهد که بیشترین تعداد گیاهان دارویی از خانواده‌های Umbelliferae، Papilionaceae و Compositae به ترتیب با ۱۶، ۲۱ و ۱۵ گونه گزارش شده است. از خانواده‌های گیاهی زیر تنها یک گونه دارویی گزارش شده است:

Anacardiaceae, Araliaceae, Boraginaceae, Cannabinaceae, Capparidaceae, Caprifoliceae, Euphorbiaceae, Fagaceae, Fumariaceae, Gentianaceae, Hypericaceae, Juglandaceae, Linaceae, Nymphaceae, Plumbaginaceae, Portulaceae, Punicaceae, Rutaceae, Simarubaceae, Urticaceae, Verbenaceae, Vitaceae لازم به تذکر است که لیست گیاهان دارویی یاد شده با تطبیق گونه‌های دارویی استان در منابع موجود و رستنی‌های گیاهی استان براساس فلور ایرانیکا (Rechinger, 1969) تهیه شده است.

شکوه و همکاران (۱۳۸۰) گیاهان دارویی شهرستان بیجار را بررسی و ۶۵ گونه از تیره‌های مختلف را شناسایی کرده‌اند. همچنین پیروتی (۱۳۶۹) گیاهان دارویی کردستان را بررسی و ۱۴۱ گونه را شناسایی و ۳۵ گونه را دارای مصرف خاص محلی معرفی کرده است.

به‌طور کلی استان کردستان منطقه‌ای سرد کوهستانی محسوب می‌شود و دوره‌های خشک آن محدود است؛ توپوگرافی خاص منطقه و وجود رشته کوههای زاگرس عوامل اساسی در تشکیل واحدهای آب و هوایی خاص و مستقل در استان هستند. جریانهای آب و هوایی مدیترانه‌ای و اروپایی و جریان هوای خشک و سردسیری و توده‌های گرم خشک آفریقاًی بر اقلیم استان مؤثر

روش مرسوم مطالعات تاکسونومیک بوده است. نمونه‌های جمع‌آوری شده براساس روش‌های مرسوم تاکسونومی گیاهی و بکارگیری منابع لازم شناسایی شد و خانواده، جنس و گونه هریک از آنها تعیین گردید. اسامی تاکسونهای منطقه به صورت فهرست الفایی و به ترتیب خانواده و نام علمی تنظیم شد. نمونه‌های جمع‌آوری شده در این بررسی در هریاریوم مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان نگهداری می‌شود.

همچنین تعدادی از اندامهای رویشی گیاهان (پیاز، ریزوم و...) در کلکسیون گیاهان دارویی واقع در ایستگاه زاله کشت شد و با کامل شدن دوره رویشی وزایشی نمونه‌های هریاریومی تهیه و مورد شناسایی قرار گرفتند. سپس گونه‌های جمع‌آوری شده با گونه‌های ذکر شده در منابع موجود در ایران (زرگری، ۱۳۶۸-۱۳۷۰؛ میرحیدر، ۱۳۷۴-۱۳۷۵؛ توکلی صابری و صداقت، ۱۳۷۱) مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت.

نتایج

جمع‌آوری و شناسایی گیاهان دارویی استان کردستان منجر به شناسایی ۸۰ گونه گیاه دارویی شد که به تغییک نام فارسی، نام علمی، نام محلی، مشخصات گیاهشناسی، مشخصات آب و هوایی رویشگاه، نقاط پراکنش در سطح استان، خواص دارویی، اندام مورد استفاده، طرز تهیه و مورد مصرف آنها تعیین گردید. در جدول ۱ فهرست نامهای علمی، فارسی و محلی گونه‌های دارویی شناسایی شده به همراه فرم رویشی، محل پراکنش، ارتفاع از سطح دریا و اندام مورد استفاده آورده شده است.

در بررسی گیاهان دارویی مورد مصرف در استان به گیاهانی برخور迪م که در منابع به مصرف دارویی آنها

پوشش خاک کم عمق برخوردار است؛ ۳- فلاتها و تراسها با فراوانی حدود ۷/۹۴ درصد شامل فلاتها و تراسها فوچانی با پستی و بلندی کم، متوسط تا زیاد است؛ ۴- دشت‌های دامنه‌ای با فراوانی حدود ۴/۵۷ درصد شامل دشت‌های دامنه‌ای نسبتاً مسطح با شب ملایم که از ویژگیهای این تیپ شوری و سنگینی خاک و وجود سنگریزه‌ها در سطح و درون خاک است؛ ۵- دشت‌های سیلانی با فراوانی ۰/۲۶ درصد که از خصوصیات آن شوری و قلیائیت زیاد خاک است؛ ۶- واریزه‌ها و آبرفت‌های بادبزنی شکل سنگریزه‌دار با فراوانی ۰/۸۳ درصد که زراعتهای آبی و دیم در این اراضی توسعه دارند؛ ۷- تیپ مخلوط شامل مخلوط تپه‌ها و فلاتها حدود ۹/۹۸ درصد است (قصریانی و معروفی، ۱۳۷۸).

مواد و روشها

برای اجرای این تحقیق ضمن بررسیهای اولیه فرمهای جهت ثبت اطلاعات گیاهان دارویی شامل نام محلی، موارد مصرف، طریقه مصرف، عوارض جانبی احتمالی، نحوه و مقدار مصرف، اندامهای مورد استفاده، نام روستای محل رویش و نام فرد یا افراد مطلع در این زمینه تهیه شد و از طریق کلاسها ترویجی سازمان جهاد کشاورزی در میان روستائیان توزیع شد و بدین ترتیب اطلاعات اولیه جمع‌آوری شد. سپس با مراجعه به شرکتها و گیاه‌درمانیهای سنتی، فروشنده‌گان و بهره‌برداران گیاهان دارویی و افراد مطلع در روستاهای مورد نظر ضمن تکمیل اطلاعات در زمینه نام محلی، نواحی برداشت و نحوه مصرف این گیاهان، نسبت به جمع‌آوری نمونه‌های گیاهی از رویشگاه‌های طبیعی و تهیه نمونه هریاریومی و تکمیل فرمهای صحراوی اقدام شد. روش جمع‌آوری گیاهان

Rosa (sp.)، ناخنک (*Astragalus hamosus*)، گل سرخ (*Astragalus hamosus*)، گل ختمی (*Alcea* sp.), بومادران (*Achillea canina*)، گل ختمی (*Anethum* sp.), رازیانه (*Foeniculum vulgare*)، شوید (*Cichorium intybus*)، خاکشی (*graveolens* sp.), کاسنی (*Hyoscyamus* sp.)، بذرالبنج (*Syimbrium* sp.)

اشاره نشده بود، در حالی که توسط مردم محلی برای مصارف دارویی از آنها استفاده می‌شد. این گیاهان که تعداد آنها ۵۹ گونه بود با علامت ستاره (*) در جدول ۱ آورده شده‌اند.

گونه‌های پرمصرف دارویی استان به شرح زیر بود:
 بابونه (*Viola odorata*), بنفسه (*Anthemis* sp.),
 شیرین بیان (*Glycyrrhiza glabra*), آویشن (*)

جدول ۱ - گیاهان دارویی شناسایی شده در استان کردستان

ردیف	نام علمی	نام خانواده	نام محلی	نام فارسی	محل جمع آوری (منطقه/ روستا)	اندام مورد استفاده
۱	<i>Acanthophyllum</i> spp.	Caryophyllaceae	تپله گون	چوبک	قروه/ مانگادول	ریشه گیاه
۲	<i>Achillea millifolium</i> L.	Compositae	درمانه سوز	بومادران	دیواندره/ ینگی کند	سرشاخه گلدار
۳	<i>Achillea</i> spp.	Compositae	بوماران، گیابوژانه	بومادران	مراعع استان	سرشاخه گلدار
۴	<i>Acroptilon repens</i> (L.) DC.	Compositae	گزگه تاله	تلخه	حاشیه مزارع	سرشاخه گلدار
۵	<i>Adiantum capillus-Veneris</i> L.	Adiantaceae	قیطران، سیاپوزه	پرسیاوشاں	مریوان/	برگ
			گل هیرو		دزلی و کاتی دینار	
۶*	<i>Aethionema grandiflora</i> Boiss & Hohen.	Cruciferae	ور	آتشین	مریوان/ گل چیه	سرشاخه گلدار
۷	<i>Alcea</i> spp.	Malvaceae	هرمله، گل هیرو	خارشتر	سارال- خورخوره	ریشه و گل
۸	<i>Alhagi persarum</i> Boiss & Buhse	Pappilionaceae	وشترخار، یانداغ		بیجار/ صلووات آباد	سرشاخه و ریشه
۹	<i>Allium cepa</i> L.	Alliaceae	پیاز	پیاز خواراکی	کاشته شده	پیاز یا ریشه
۱۰	<i>Allium hirtifolium</i> Boiss.	Alliaceae	سیرگنکه	موسیر	سارال/ باینجوب	پیاز یا ریشه
۱۱*	<i>Allium kharputens</i> fveyn. & Sint.	Alliaceae	سیرونه، سوره‌بهن	پیاز زاگرسی	موچش/ کویک	پیازچه
۱۲	<i>Amygdalus lycoides</i> spach	Rosaceae	تنگر	تنگر	مریوان	میوه
۱۳	<i>Amygdalus</i> spp.	Rosaceae	بادام کیفی	بادام وحشی	دیواندره/ سارال	هسته میوه
۱۴	<i>Anethum graveolens</i> L.	Umbelliferae	شویت	شوید	کاشته شده	برگ و ساقه
۱۵	<i>Anthemis haussknechtii</i> Boiss. & Reut.	Compositae	گل چاوایشه	بابونه	مریوان/ جنت بو	گلهای زبانه‌ای و اندام
۱۶	<i>Anthemis</i> spp.	Compositae	گلاله حاجیانه	بابونه	مراعع استان	رویشی گل

ردیف	نام علمی	نام خانواده	نام محلی	نام فارسی	محل جمع آوری (منطقه/ روستا)	اندام مورد استفاده
۱۷	<i>Arctium lappa</i> L.	Compositae	بابا آدم	بیجار/حسین خان		برگ و ساقه
۱۸	<i>Aristolochia botta</i> Jaub& spach.	Aristolochiaceae	زرآوند	دیواندره/جاده		میوه و دانه
۱۹*	<i>Artemisia haussknechtii</i> Boiss.	Compositae	برزه لنگ، ورکمر	درمنه زاگرسی	مریوان	سرشاخه گلدار
۲۰	<i>Arum giganteum</i> A.Ghahreman.	Araceae	هاز	گل شیپوری	گردنه ماموخ/ چم حصیل آباد	برگ و دانه
۲۱	<i>Astragalus (Tragacantha) spp.</i>	Papilionaceae	گون	گون	مراتع استان	صمغ (کتیرا)
۲۲	<i>Astragalus hamosus</i> L.	Papilionaceae	ناخنک، سه پره	اکلیل کوهی	مریوان/برقو	میوه
۲۳	<i>Barbarea plantaginea</i> DC.	Cruciferae	فاطمه آری	ترتیزک جویباری	قروه/قری چای	برگ
۲۴	<i>Bellevalia sarmatica</i> (pall.ex Georgi) woron	Liliaceae	پیازخوانه	تمشکین تماشابی	سارال/باینجوب، ماموخ سفلی	پیاز گیاه
۲۵*	<i>Beta lomatogona</i> fisch . & Mey.	Chenopodiaceae	چونهار	چغندر	مریوان/سرخ آباد	ریشه گیاه
۲۶*	<i>Bryonia aspera</i> stev. Ex ledeb	Cucurbitaceae	پوشینه مارانه	فاسرای زیر	مریوان/چور	تمام قسمتهای گیاه
۲۷	<i>Cardaria draba</i> (L.) desv.	Cruciferae	وردینه	ازمک	مریوان/سعد و سلیمانه	دانه یا بذر گیاه
۲۸*	<i>Centaurea agrigata</i> Fisch. & C.A. mey.exdc	Compositae	گرالک	گل گندم انبوه	بانه/منیجلان	اندام هوایی
۲۹	<i>Centaurea iberica</i> Terv.ex.Spreng.	Compositae	چاوزاشه	گل گندم چمنزار	بیجار/حسین خان	ریشه و گل گیاه
۳۰	<i>Centaurea imperialis</i> hausskn.ex Bornm.	Compositae	سوپلایسره، خیگ	گل گندم اشرافی	سارال/باینجوب	ریشه گیاه
۳۱	<i>Centaurea solstitialis</i> L.	Compositae	درکه زرد	گل گندم زرد	مریوان/برقلعه	ریشه گیاه
۳۲*	<i>Cerasus microcarpa</i> (C.A. Mey.) Boiss	Rosaceae	بالالو	بالالو	مریوان/چور، دزلی	گل، هسته، میوه
۳۳	<i>Chaerophyllum crinitum</i> Boiss.	Umbelliferae	آگه جواش	جعفری فرنگی	دهگلان/تیلکو	تمام قسمتهای گیاه
۳۴	<i>Cichorium intybus</i> L.	Compositae	چق چقه	کاسنی	حاشیه مزارع	برگ و ریشه
۳۵*	<i>Cotoneaster hissarica</i> Pojark.	Rosaceae	شیرخشت	شیرخشت	سنندج	میوه
۳۶*	<i>Cotoneaster nummularia</i> Fisch & C.A.Mey	Rosaceae	شیرخشت	شیرخشت	سنندج	میوه
۳۷*	<i>Cotoneaster ovatus</i> Pojark.	Rosaceae	شیرخشت	شیرخشت	سنندج	میوه
۳۸	<i>Crataegus</i> spp.	Rosaceae	گویش، بلچ	زالزالک	بانه/سبدلو	برگ و میوه
۳۹	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) pers.	Graminae	هریز، هریز	مرغ	بیجار	ریشه
۴۰	<i>Dactylorhiza Umbrosa</i> (kar & kir) Neveski	Orchidaceae	سالمه	ثعلب	جنوب دریاچه زریوار- سارال- شمال سنندج	ریشه غدهای
۴۱*	<i>Daphne mucronata</i> Royle	Thymelaeaceae	تیرو	دافنه	سفرز	سرشاخه گلدار

ردیف	نام علمی	نام خانواده	نام محلی	نام فارسی	محل جمع‌آوری (منطقه/ روستا)	اندام مورد استفاده
۴۲	<i>Datura stramarium</i> L.	Solanaceae	داتوره، تاتوله	تاتوره	سنندج به سمت کامیاران	برگ
۴۳	<i>Eleagnus angustifolia</i> L.	Eleagnaceae	سرینچک	سنجد	حاشیه باغها	میوه
۴۴	<i>Eryngium</i> spp.	Umbelliferae	طوسی	چیچاخ	بیجار/ برگشاد	ساقه جوان، صمع ریشه
۴۵	<i>Euphorbia allepica</i> L.	Euphorbiaceae	خشیلک، خریلک	شیرسگ	سارال/ چتان	ریشه غده‌ای
۴۶	<i>Falkaria vulgaris</i> Bernh.	Umbelliferae	غازیاخی	غازیاخی	مراتع و زمینهای آیش	برگ تازه
۴۷	<i>Ferula assa-foetida</i> L.	Umbelliferae	کما	آنقوره	کامیاران/ هندیمن	برگ
۴۸*	<i>Ferula haussknechti</i> Wolffex Rech.f.	Umbelliferae	کما	کما	کامیاران/ هندیمن	برگ
۴۹*	<i>Ferula oopoda</i>	Umbelliferae	کما	کما	کامیاران/ هندیمن	برگ
۵۰*	<i>Ferula orientalis</i> L.	Umbelliferae	کما	کما	کامیاران/ هندیمن	برگ
۵۱*	<i>Ferula persica</i> Willd.	Umbelliferae	کما	کما	کامیاران/ هندیمن	برگ
۵۲	<i>Ferulago angulata</i> (Schlecht.) Boiss.	Umbelliferae	-	چویل	جنوب غرب استان	برگ
۵۳	<i>Ficus carica</i> L.	Moraceae	هنچیر	انجیر	سروآباد	میوه
۵۴	<i>Foeniculum vulgar</i> miller	Umbelliferae	رازیانه	رازیانه	مریوان/ اویهنج	دانه یا بذر
۵۵	<i>Fraxinus rotundifolia</i> Miller	Oleaceae	چوربناو	زبان گنجشک	بیجار/ حسین خان	برگ، پوست، و شاخه جوان
۵۶	<i>Fumaria vaillantii</i> Loisel.	Fumariaceae	شاهتره	شاهتره	دیواندره/ حاشیه مزارع	تمام قسمتهای گیاه
۵۷*	<i>Gladiolus atroviolaceus</i> Boiss.	Iridaceae	اسپک	گلابیول	دیواندره	گل
۵۸*	<i>Glucium grandiflorum</i> Boiss. & Huet.	Papaveraceae	هلپاچان	شقائق	دیواندره/ ساوله	برگ
۵۹	<i>Glycyrhiza glabra</i> L.	Papilionaceae	شیرین بلک	شیرین بیان	کامیاران/ ابراهیم آباد	برگ و ریشه
۶۰*	<i>Grammosciadium scabrum</i> . Boiss.	Umbelliferae	دوسمورکه، سمو	شوید کوهی	مریوان/ ریخلان- کامیاران/ میسورآپ	برگ جوان و میوه
۶۱	<i>Gundelia tournefortii</i> L.	Compositae	رنگ	کنگر	سارال/ گران علیا	دانه
۶۲	<i>Gypsophila caricifolia</i> Boiss.	Caryophyllaceae	صپون	گچ دوست	سارال/ زردوان	ریشه گیاه
۶۳	<i>Helichrysum</i> spp. (armenium & pallasii)	Compositae	گل توب، گل	گل بی مرگ، افسطین	سنندج/ ماموخ سفلی	سرشاخه گلدار
۶۴*	<i>Heliotropium</i> spp.	Boraginaceae	بیرو	آفتاب پرست	بانه / منیجلان	اندام هوایی
۶۵*	<i>Heracleum persicum</i> Desf. exfischev.	Umbelliferae	سولان	گلپر	سرشاخه گلدار	دانه یا بذر
۶۶	<i>Hyoscyamus Kotschianus</i> pojark.	Solanaceae	خرینک	بذرالبنج	سنندج به سمت دیواندره	دانه یا بذر

ردیف	نام علمی	نام خانواده	نام محلی	نام فارسی	محل جمع آوری (منطقه/ روستا)	اندام مورد استفاده
۶۷	<i>Juglanse regia L.</i>	Juglandaceae	گویز، گردکان	گردو	بانه/ سبدلو	پوست میوه و برگ
۶۸	<i>Juncus inflexus L.</i>	Juncaceae	پیزول	سازو	بیجار/ حسین خان	ساقه گلدار و ریشه
۶۹	<i>Prunella vulgaris L.</i>	Labiatae	گیازوفه	نعمان چمنی	مریوان/ قمچیان	اندام رویشی
۷۰	<i>Lactuca seriola L.</i>	Compositae	تالیشک-	کاهوی خاردار	مریوان/ دزلی - دلانی	برگ جوان
			تالینجک			
۷۱	<i>Lallemantia royleana</i> (Benth.in wall.) Benth	labiate	بالنگو	بالنگو شیرازی	سارال/ هانه گلان	دانه گیاه
۷۲	<i>Lepidium latifolium L.</i>	Cruciferae	قچی،	ترتیزک	قاروه/ قری چای- سارال	برگ، ساقه و گل
			خون بس	برگ پهن		
۷۳	<i>Linaria fastigiata Chav.</i>	Scrophulariaceae	گرمک	کتانی منشعب	بیجار/ حسین خان	برگ
۷۴	<i>Linum album ky.ex.Boiss</i>	Linaceae	گیاکام	کان	سارال/ گزان علیا	سرشاخه گلدار،
						اندام هوایی
۷۵	<i>Linum usitatisimum L.</i>	Linaceae	بذرک	بذرک	سارال- مریوان	اندام هوایی
				/ دزلی		
۷۶*	<i>Loranthus grewinki Boiss. & Buhse</i>	Lorantaceae	موخور، موکانه	موخور	بانه	تمام قسمتهای گیاه
۷۷	<i>Malva neglecta wallr.</i>	Malvaceae	پنیرک	پنیرک	سرو آباد/ دورود	برگ
			تلله که، پیکه ملیچکانه			
۷۸	<i>Malva sylvestris L.</i>	Malvaceae	پنیرک	پنیرک	قروه/ آصف آباد	گل و میوه
۷۹	<i>Medicago rigidula L.</i>	Papilionaceae	یونجه	سه پره	کامیاران/ هندیمن	تمام قسمتهای گیاه
۸۰	<i>Melissa officinalis L.</i>	Labiatae	بادرنجبویه، فرنجمشک	نارنجبو، گیا سوا	مریوان/ کماله	برگ
۸۱	<i>Morus alba L.</i>	Moraceae	توت	توت	مریوان/ کانی دینار	میوه، سرشاخه
						میوه‌دار
۸۲	<i>Narcissus tazetta L.</i>	Amaryllidaceae	نرگس شهلا	نرگس	مریوان/ دزلی	پیاز یا ریشه
۸۳	<i>Nasturtium officinalis (L.) R.Br.</i>	Cruciferae	بلاغ اوتی	کوزله	بیجار/ ینگی کند	برگ و ریشه در
						ابتدای رویش
۸۴*	<i>Nigella oxypetala Boiss.</i>	Ranunculaceae	سیاه دانه	سیاوله	مریوان/ انجمنه	دانه گیاه
۸۵*	<i>Onopordon carduchrum bornm. & beaur. DC.</i>	Compositae	خار پنبه شاهوئی	کرکول	بیجار	دانه گیاه
۸۶	<i>Onosma armenum DC.</i>	Boraginaceae	عسلک	گیدارمانه	سارال/ ماموخ سفلی	سرشاخه گلدار
۸۷	<i>Orchis palustris jacq.</i>	Orchidaceae	ثعلب	سالمه	جنوب دریاچه زربوار- سارال- شمال ستندج	ریشه غده‌ای

ردیف	نام علمی	نام خانواده	نام محلی	نام فارسی	محل جمع‌آوری (منطقه/ روستا)	اندام مورد استفاده
۸۸*	<i>Ornithogalum umbellatum</i>	Liliaceae	گیلاخه	شیر مرغ چتری	مریوان/ برد سفید	برگ جوان
۸۹	<i>Papaver bracteatum</i>	Papaveraceae	گلاله سوره	خشخاش کبیر	مریوان/ انجمنه	گلبرگ
۹۰	<i>Papaver spp.</i>	Papaveraceae	گلاله سوره	شقایق	مراعع شمال غرب سنتدج و کامیاران	گل و کپسول
۹۱	<i>Peganium harmala L.</i>	Zygophyllaceae	قانگ، هرمل	اسپند	بیجار/ پیرتاج	دانه یا میوه
۹۲	<i>Pelargonium quercetorum Agnew</i>	Geraniaceae	گلاریوسی	شمعدانی عطربی	مریوان/ بندول	برگ
۹۳	<i>Phlomis olivieri Benth.</i>	labiatae	مه رو	گوش بره یا چالمه	خورخوره/ خورخوره	سرشاخه گلدار
۹۴	<i>Physalis alkekengi L.</i>	Solanaceae	تمامه جنانی	عروسوک پشت	کامیاران/ پالنگان	میوه و برآکه رنگی
			پرده	دیواندره		
۹۵	<i>Pistacia atlantica Desef.</i>	Anacardiaceae	ون، غزوان	بنه	بانه	پوست درخت
۹۶	<i>Plantago spp.</i>	Plantaginaceae	رک اشه	بارهنگ	سارال/ ماموخ سفلی	برگ و دانه
۹۷	<i>Platanus orientalis L.</i>	Platanaceae	جوهر، په لک	چنار	مریوان/ سرو آباد	برگ و پوست
۹۸	<i>Plumbago europaea L.</i>	Plumbaginaceae	سیاگاری، گیا	علف سربی، علف	اورامان/ کماله	ریشه
			دندان			
۹۹	<i>Polygonum aviculare L.</i>	Polygonaceae	دوماره کول، گیا عقره	علف	مریوان/ درکی	برگ و ساقه
			هفت بند			
۱۰۰	<i>Polygonum persicaria L.</i>	Polygonaceae	گیاهفتبرگ، قفققه سوره	علف	سقز/ قباغلو، بانه/ منیجلان	تمام قسمتهای گیاه
۱۰۱	<i>Polygonum spp.</i>	Polygonaceae	گیاعقره، دوماره کول	علف هفت بند	سقز/ حاشیه مزارع	سرشاخه گلدار
۱۰۲*	<i>Populus alba L.</i>	Salicaceae	چنار	سبیدار	سنندج	پوست درخت، برگ
۱۰۳	<i>Portulaca oleracea L.</i>	Portulacaceae	پلپینه	خرفه	دیواندره/ کول	تمام قسمتهای گیاه
۱۰۴	<i>Prangus ferulaceae (L.) lindel</i>	Umbelliferae	هیلیز، آلیز	جادشیر	بانه/ مراعع سبدلو	صمغ ساقه و ساقه
۱۰۵	<i>Primula auriculata lam</i>	Primulaceae	روح توپیا	پامچال	قروه/ مانگادول بیجار/ ینگی کند	ساقه گلدار
۱۰۶	<i>Punica granatum L.</i>	Punicaceae	هnar	انار	کامیاران/ طاء	ریشه درخت
۱۰۷	<i>Quercus infectoria oliv.</i>	Fagaceae	مازووار	مازودار	غرب استان، مناطق جنگلی	پوست درخت و میوه، گال
۱۰۸	<i>Ranuculus arvensis L.</i>	Ranunculaceae	پوپ کله شیره	آلله	مریوان/ دزلی-دلانی	تمام قسمتهای گیاه
					تازه	

ردیف	نام علمی	نام خانواده	نام محلی	نام فارسی	محل جمع آوری (منطقه/ روستا)	اندام مورد استفاده
۱۰۹*	<i>Ranunculus sericeus</i>	Ranunculaceae	چنارکله	آلاله	مریوان/ سعد و سلیمانه	برگ
۱۱۰	<i>Banks & soland</i>		آلتنه کپولیله	ورث	سقز/ خورخوره	میوه و انه
۱۱۱	<i>Reseda lutea L.</i>	Resedaceae	ریواس	ریواس	مریوان/ ذلی	گل، بذر، ریشه
۱۱۲	<i>Rheum ribes L.</i>	Polygonaceae	سماخ	سماخ	مریوان/ اورامان و تفلی	میوه گیاه
۱۱۳	<i>Rhus Coriaria L.</i>	Anacardiaceae	اقاقيا	اقاقيا	بیجار	گل
۱۱۴	<i>Rosa canina L.</i>	Rosaceae	گل باخی، شیلان	گل سرخ	مریوان/ جنت بو	گل و نهنج آن
۱۱۵*	<i>Rosa foetida Herrm.</i>	Rosaceae	دلیق	نسترن زرد	سنندج/ سو و گندمان	گل
۱۱۶	<i>Rosa persica Michx.ex juss</i>	Rosaceae	ورک ده	ورک	بیجار/ مسیر توب آغاج	نهنج گل و دانه
۱۱۷	<i>Rumex spp.</i>	Polygonaceae	سیچکه، تریشکه	ترشک	مریوان/ قلعه جی	بذر یا میوه
۱۱۸	<i>Salix spp.</i>	Salicaceae	بی	بید	مریوان/ جنت بو	برگ
۱۱۹	<i>Salsola kali L.</i>	Chenopodiaceae	دواقاری	- زراق-	دیواندره/ ینگی کند	اندام هوایی
۱۲۰	<i>Salvia syriaca L.</i>	Labiatae	سیفوکه	مریم گلی	بیجار/ حسین خان	اندام هوایی گیاه
۱۲۱	<i>Scabiosa flavida Boiss. & hausskn.</i>	Dipsacaceae	-	طوسک بهبهانی	بیجار/ جاده تکاب	ساقه، برگ و گل
۱۲۲*	<i>Sisymbrium spp.</i>	Cruciferae	حاکشی	حاکشی	دهگلان/ آئی پینک	دانه یا بذر گیاه
۱۲۳	<i>Smyrnium cordifolium</i> Boiss.	Umbelliferae	نینور، گنور	آوندول	مریوان/ چناره	بذر یا دانه
۱۲۴	<i>Solanum nigrum L.</i>	Solanaceae	رزله	تاجریزی	سقز/ علف هرز	میوه یا دانه
۱۲۵	<i>Sophora aleupecuroides</i> L.	Papilionaceae	تالک تلخین	تلخ بیان	سارال/ سنگ سفید	اندام هوایی
۱۲۶	<i>Stachys lavandulifolia</i> vahl.	Labiatae	گل چای	چای کوهی	مراتع سارال- سانگا دول-	سرشاخه گلدار
۱۲۷*	<i>T. dasyurum C. presl</i>	Papilionaceae	کالکه ریوی	شبدر طناز	مریوان/ چور	//
۱۲۸*	<i>T. elliptica</i> Boiss.	Papilionaceae	شملى	شببلیله	دیواندره و بیجار	دانه و برگ
۱۲۹*	<i>T. kotschyi</i> Bge.	Tamaricaceae	گز	گز بیجار	//	//
۱۳۰*	<i>Tamarix ramosissima</i> Ledeb.	Tamaricaceae	گز بیجار	گز	سقز/ منیجلان، دیواندره،	سرشاخه، ساقه
۱۳۱	<i>Teucrium polium L.</i>	Labiatae	مریم نخودی	گلپوره	سارال- خورخوره	سرشاخه گلدار
۱۳۲*	<i>Thalictrum minus L.</i>	Ranunculaceae	گیا بارزانی	برگ سدابی	سقز/ سته	برگ
۱۳۳	<i>Thymus spp.</i>	Labiatae	هزبوبکیفیله	آویشن کوهی	سارال- خورخوره	سرشاخه گلدار
۱۳۴*	<i>Tragopogon graminifolia</i> DC.	Compositae	شن	شنگ	مریوان	برگ جوان

ردیف	نام علمی	نام خانواده	نام محلی	نام فارسی	محل جمع‌آوری (منطقه/ روستا)	اندام مورد استفاده
۱۳۵	<i>Tribulus terres-tris</i> L.	Zygophyllaceae	پیکول	خارخسک	بیجار/ پرتابج	میوه
۱۳۶*	<i>Trifolium purpureum</i> Loisel.	Papilionaceae	کالکه ریوی	شبدر ارغوانی	مریوان/ چور	تمام قسمتهای گیاه
۱۳۷*	<i>Trigonella coerulescens</i> (M.B.) halacsy	Papilionaceae	شملی	شنبلیله	کامیاران/ هندیمن	دانه و برگ
۱۳۸*	<i>Turgenia latifolia</i> (L.) Hoffm.	Compositae	پره میشکه، پژه	گیس چسبک	مریوان/ برقلعه	تمام قسمتهای گیاه
			گرگر			
۱۳۹	<i>Urtica dioica</i> L.	Urticaceae	کرنکه	گزنه	سارال/ هانه گلان	ریشه، برگ و ساقه
۱۴۰*	<i>Verbascum</i> sp.	Scrophulariaceae	ژاره ماسی	گل ماهور	سقز/ قباغلو	سرشاخه گلدار
۱۴۱	<i>Verbena officinalis</i> L.	Verbenaceae	گیادرمانه	شاه پسند	دیواندره/ ماموخ سفلی	تمام قسمتهای گیاه
۱۴۲	<i>Viola odorata</i> L.	Violaceae	گل و نوش	بنغشه معطر	سندهج/ تودار صمدی	گل
۱۴۳	<i>Zea mays</i> L.	Graminae	گه نه مه شامی	ذرت	مریوان/ کماله	کاکل ذرت
۱۴۴*	<i>Zerauchania aucheri</i> Boiss.	Umbelliferae	بهرهزا	-	مریوان/ دزلی، کوههای dalani	برگ جوان

بحث

ثعلب، شیرین بیان، موسیر و گیاهان دارویی دیگر به صورت خام از استان خارج و روانه بازارهای خارج از کشور شده و پس از فرآوری با چند برابر قیمت وارد کشور می‌شود. در صورتی که با شناخت توانمندیهای موجود و برنامه‌ریزی صحیح می‌توان ضمن تأمین مواد اولیه جهت کارخانه‌ها و شرکتهای داروسازی و کاهش وابستگی کشور در این زمینه به خارج، داروی مورد نیاز کشور را از فرآورده‌های طبیعی و گیاهان دارویی تهیه و صنایع مرتبط با این بخش را تقویت نمود و در عین حال به امر حفاظت محیط‌زیست نیز توجه کرد.

محصولات فرعی گیاهی که بیشترین برداشت را در سطح استان دارند شامل کتیرا و سقز است که طبق آمار اداره کل منابع طبیعی استان از سال ۱۳۸۶ لغاًیت ۲۹۰ تن کتیرا و ۷۵۰ تن سقز از مراعع و جنگلهای استان برداشت شده است. همچنین موسیر و ثعلب از مراعع استان برداشت و به خارج از استان و گاهی خارج از کشور صادر می‌شود. آمار

با توجه به وضعیت مطلوب اقلیمی و شرایط خاص توپوگرافی و زونهای متفاوت آب و هوایی و تنوع پوشش گیاهی در استان کردستان، این استان از غنای گونه‌ای زیادی برخوردار بوده و همین امر سبب گردیده است که اهالی استان از گذشته بسیار دور به استفاده از گیاهان دارویی توجه ویژه داشته باشند، به گونه‌ای که اکنون نیز در بیشتر روستاهای معالجات سنتی توسط افراد شاخص و مورد اعتماد مردم که بعضاً از رهبران دینی و مذهبی منطقه هستند با استفاده از منابع گیاهی انجام می‌شود.

بنابراین عدم آگاهی کشاورزان استان، نبود صنایع تبدیلی، فقدان دستگاه اجرایی خاص جهت ترسیم خطمشی اجرایی در زمینه بازاریابی، روش‌های فرآوری و ایجاد صنایع تبدیلی گیاهان دارویی سبب خروج این گیاهان و فرآورده‌های طبیعی به صورت خام از استان می‌شود. به طوری که سالیانه میزان قابل توجهی کتیرا، سقز،

واحد بهره‌برداری اداره کل منابع طبیعی استان نشان می‌دهد که از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۶ ۲۵۰ تن موسیر از مراتع استان برداشت شده است (استعلام از اداره کل منابع طبیعی استان کردستان) و گرچه آماری در مورد برداشت ثعلب وجود ندارد اما ثعلب یکی از محصولات عمده مراتع مرطوب استان است که توسط روستاییان از رویشگاه اصلی برداشت و به قیمت‌های بالایی به فروش می‌رسد (به استناد تحقیق مؤلف، در بازار سنتدج غده گرد به قیمت هر کیلو ۵۰۰ هزار ریال و غده چند شاخه ۶۰۰ هزار ریال).

منابع مورد استفاده

- پیروتی، م. ۱۳۶۹. جمع‌آوری و بررسی گیاهان دارویی کردستان واقع در شمال مهاباد و انجام آزمایشات فیتوشیمیابی و میکروسکوپی روی چهار گونه گیاهی. پایان‌نامه دکتری داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
- توکلی صابری، م.ر. و صداقت، م.ر.، ۱۳۷۱. گیاهان دارویی. (ترجمه)، چاپ چهارم، انتشارات روزبهان، تهران، ۲۶۴ صفحه.
- زرگری، ع.، ۱۳۶۸-۱۳۷۰. گیاهان دارویی. جلد ۱-۵، انتشارات مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، ۴۸۵۰ صفحه.
- شکوه، ا.، زهزاد، ب. و سنبلي، ع.، ۱۳۸۰. بررسی انتوپوتانیکی گیاهان دارویی شهرستان بیجار. چکیده مقالات همایش ملی گیاهان دارویی ایران، تهران، ۲۶-۲۴ بهمن: ۲۰۰.
- قصریانی، ف. و معروفی، ح.، ۱۳۷۸. شناخت مناطق اکولوژیک کشور، بوشتهای گیاهی استان کردستان. مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراعع کشور، ۷۸ صفحه.
- معاونت آموزش و پژوهش سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران، ۱۳۷۵. گلکاری. (ترجمه)، جلد اول، انتشارات سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران، ۲۹۴ صفحه.
- میرحیدر، ح.، ۱۳۷۴-۱۳۷۵. معارف گیاهی و کاربرد گیاهان در پیشگیری و درمان بیماریها. جلد ۱-۸، انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۴۲۰۴ صفحه.
- Rechinger, K.H., 1969. Flora Iranica, Graz, Austria, 6422p.

لازم به یادآوری است که ثعلب گیاهیست که در شرایط خاصی رشد می‌کند و رویشگاه‌های محدودی دارد. گونه‌های ثعلب موجود در استان حالت علفی داشته و امکان قلمهزنی نیز جهت تکثیر رویشی وجود ندارد، تنها با تقسیم غده با وجود تک جوانه بودن غده می‌توان چند جوانه روی غده بوجود آورد که نیازمند بررسی و آزمایش‌های بیشتر و برآورده هزینه است. بر اساس گزارش معاونت آموزش و پژوهش سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران (۱۳۷۵) امروزه بذر ثعلب در محیط کشت مغذی توسط پرورش دهنده‌گان گل ارکیده جوانهزنی و تا مرحله گلدهی پرورش می‌یابد.

به نظر می‌رسد که گونه‌های مورد مصرف و موارد مصرف آنها در نقاط مختلف کشور شباهت‌هایی داشته باشند. با کنار گذاشتن این گونه موارد بعضی از گونه‌ها دارای موارد مصرف خاصی هستند؛ مثلاً در استان کردستان *Anthemis haussknechtii* با نام محلی گلاله حاجیانه برای از بین بردن لکه سفید روی مردمک چشم که در اصطلاح محلی "تانه" اطلاق می‌شود مصرف شده و عملاً این لکه‌ها با توجه به نوع و مدت زمان تشکیل لکه قابل درمان است و از نایینایی *Pelargonium* چشم پیشگیری می‌کند و یا گونه

Medicinal plants of Kurdistan province

F. Hooshidari¹

1- Agricultural and Natural Resources Research Center of Kurdistan Province, Sanandaj, Iran,
E-mail: hooshidar2005@yahoo.com

Received: June 2008

Revised: September 2008

Accepted: October 2008

Abstract

With regard to importance of medicinal plants, this study has carried out in Kurdistan province in 1998-2001 for identification of medicinal plants of this province. There were various stages contained collection of rural and locale information about medicinal plants, field and in situ investigations and collection of herbal samples and identification of them. According to results, 144 medicinal plants species were identified that 59 species of them were new in comparison with previous references. The most numbers of medicinal plants were belong to the families of Compositae, Umbelliferae, Papilionaceae, Rosaceae, Labiate, Cruciferae, Solanaceae, Ranunculaceae, Alliaceae, Malvaceae, Liliacea with 18, 16, 11, 10, 8, 6, 4, 4, 3, 3 and 3 species, respectively. In addition Anacardiaceae, Caryophyllaceae, Chenopodiacea, Linaceae, Orchidaceae, Tamaricaceae, Polygonaceae, Moraceae, and Papaveraceae families allocated 2 species and the other families included one species.

Key words: Medicinal plants, collection, identification, Kurdistan Province.